

de permis

PROCÉDURES NORMALES DE FONCTIONNEMENT – GESTION DE LA PRÉ-TRAITE

Objectif : Pour s’assurer que toutes les surfaces qui entrent en contact avec le lait soient propres avant la traite.

PNF	Détails
Procédures pour le bassin	
<i>Si le bassin est vide, assurez-vous qu’il ait été nettoyé, activez le cycle d’assainissement, laissez-le se vider, fermez la valve et resserrez le couvercle anti-poussière en place.</i>	• Raccorder la laveuse au réservoir en insérant l’entrée de celle-ci dans l’orifice au bout du bassin. • Vérifier la température de l’eau chaude et ajouter le détergent selon la charte de lavage. • Régler la minuterie de la laveuse à la position départ. • Une fois le réservoir à lait lavé, inspecter l’intérieur et s’assurer qu’il a été lavé correctement et qu’il n’y a aucun dépôt sur les surfaces internes. • Désinfecter 30 minutes avant la première traite. Ajouter le désinfectant dans le bocal selon la charte de lavage et tourner la minuterie à la position “désinfection”. Retirer l’entrée, fermer la valve et bien fermer le bouchon protecteur.
<i>Activez le bassin refroidisseur une fois que le lait a atteint l’agitateur.</i>	• Lorsque la lumière rouge s’allume dans la salle de traite, allumer le refroidisseur. NOTE: Ceci s’applique seulement à la première traite lorsque le réservoir est vide avant la traite.
Préparation de l’équipement de traite	
<i>Assainissez le lactoduc 30 minutes avant la traite et assurez-vous qu’il se draine complètement.</i>	• Installer un nouveau filtre à lait. • Le système est programmé pour désinfecter à 3h 30 et 14h 30. • La traite matinale ne doit pas débuter avant 4h 00, la traite de l’après-midi ne doit pas débuter avant 15h 00, de façon à permettre un égouttage adéquat du système de traite. • Ouvrir les valves à air derrière les compresseurs pour souffler de l’eau qui serait encore dans le lactoduc avant la traite.
<i>Préparer l’équipement et les fournitures pour la traite.</i>	• Mettre le collet sur le tuyau sous le groupe de réception. • Tourner la minuterie d’eau dans la laiterie pour partir le pré-refroidisseur. • Tourner la valve du pré-refroidisseur de la position horizontale fermée à la position verticale ouverte. • Raccorder le tuyau de transfert au réservoir à lait. • Éteindre l’alimentation de la salle de traite pendant quelques secondes et l’allumer de nouveau pour activer les décrocheurs. • Prendre le bouchon de lait de l’évier de lavage et le mettre dans le groupe réception. Tourner la minuterie à la position traite. • Vérifier le babillard dans la salle de traite pour vaches traitées et qui viennent de vèler. • Prendre suffisamment de serviettes propres pour la traite (du panier). • Remplir la tasse de bain de trayons avec un bain de trayons 1% (Bovi-Kote), remplir la tasse de bain de trayons de pré-traite avec un bain de trayons 0.5% (Theratec). • Positionner les barrières dans l’étable de façon à ce que les vaches puissent entrer dans l’aire d’attente. • S’assurer que les barrières soient en position baissées et que les barrières d’entrées soient ouvertes. Si les barrières sont en haut, les baisser en appuyant sur la flèche qui pointe vers le bas sur le panneau de contrôle.

de permis

PROCÉDURES NORMALES DE FONCTIONNEMENT – GESTION DE LA TRAITE

Objectif : Pour s’assurer que le lait est récolté de façon à prévenir la contamination et de promouvoir la santé de la glande mammaire.

PNF	Détails
Traite	
<i>Premiers jets Tremper / laver Sécher Appliquer Trempage post traite</i>	• Enfiler des gants en nitrile. • Si nécessaire, essuyer les trayons avec une serviette pour enlever tout excès de saletés. • Pré-tremper chaque traxon avec Theratec en allouant un minimum de 30 secondes de temps de contact. • Les 2 ou 3 premiers jets de chaque quartier doivent être extraits sur le plancher pour détecter toutes anomalies. • Si le lait est anormal, traire la vache avec un seau ou trayeuse à quartier. • Sécher les trayons et bouts de trayons avec une nouvelle serviette en tissu et les jeter dans le seau “serviettes sales”. • Attacher l’unité dans les 45-90 secondes de l’application et aligner les boyaux à lait pour qu’ils soient parallèles à la vache. • Tremper et faire sortir les premiers jets de lait en groupes de quatre et retourner à la première vache pour le séchage et la pose de la trayeuse (s’assurer qu’un temps d’environ 30 secondes persiste entre l’application du pré-trempage et du séchage). • Lorsque la trayeuse a été détachée, vérifier le pis pour égouttage complet, tremper avec BoviKote (s’assurer d’une couverture complète du traxon). • Après la traite et le trempage de toutes les vaches d’un côté, les libérer en appuyant sur le bouton rouge avec la flèche pointant vers le haut. Le prochain groupe de vaches accède la plate-forme en appuyant sur le bouton rouge avec une flèche pointant vers le bas.
Animaux traités / animaux avec du lait anormal	
<i>Faire la traite des animaux traités selon les procédures pour animaux traités.</i>	• Les vaches traitées ou avec lait anormal doivent être traitées avec un seau et trayeuse séparé. • Les vaches traitées ou avec lait anormal sont identifiées avec une bande sur une jambe. Le lait de ce seau DOIT être jeté dans la fosse à fumier liquide. • Se référer aux procédures de vaches traitées sur le PEN.

de permis

PROCÉDURES NORMALES DE FONCTIONNEMENT – GESTION DE L'APRÈS-TRAITE

Objectif : Pour s'assurer que l'équipement de traite soit nettoyé immédiatement après l'usage pour prévenir la croissance de bactéries.

PNF	Détails
Nettoyez l'équipement de traite	
<i>Une fois la traite complétée, préparez l'équipement pour le lavage et activez le cycle de lavage.</i>	• Lorsque la traite est terminée, replacer les trayeuses dans le râtelier de lavage comme elles étaient avant la traite. • Éteindre la minuterie d'eau dans la laiterie pour arrêter le pré-refroidisseur. • Couper l'alimentation de la salle de traite pour désactiver les décrocheurs. • Pomper le lait hors de la ligne en utilisant le contrôle manuel de la pompe situé sous le refroidisseur à plaques. • Souffler le lait hors de la ligne en appuyant sur le bouton de traite situé au-dessus de l'évier de lavage. • Enlever le collet du boyau au groupe de réception. • Tourner les valves du pré-refroidisseur à la position fermée. • Déplacer le tuyau d'alimentation du réservoir jusqu'à l'évier. • Allumer les deux lumières sur le panneau de traite au décrocheur. • Régler la minuterie sur le panneau du lactoduc à la position lavage. • Lorsque le rinçage est terminé, régler la minuterie à la position acide. • Sur les panneaux Dairy Chem, appuyer sur Enter jusqu'à ce que le voyant P3 s'allume et tenir pendant 20 secondes. • Mettre les serviettes sales à la laveuse. Ajouter une tasse de détergent (Santex). Mettre toutes les serviettes sèches dans le panier et les serviettes propres mouillées dans la sècheuse. • Nettoyer la plate-forme dans la salle de traite à l'aide d'un boyau. • S'assurer que toutes les barrières soient fermées et enchaînées pour l'étable à stabulation libre et la salle de traite. • Nettoyer tous résidus de lait dans la laiterie.

de permis

PROCÉDURES NORMALES DE FONCTIONNEMENT – GESTION DES MÉDICAMENTS DU BÉTAIL

Objectif : Pour s’assurer que le lait ou la viande qui est mise en marché soit sécuritaire pour la consommation humaine et ne contiennent pas de résidus.

PNF	Détails
Entreposage	
<i>Entreposez selon les indications sur l’étiquette.</i>	• Les médicaments sont entreposés au réfrigérateur selon le mode d’emploi sur l’étiquette. • Les bouteilles, seringues, aiguilles ou médicaments échus doivent être jetés dans un contenant libellé “Déchets MB” dans une armoire dans la salle d’entreposage et donné au vétérinaire lorsque pleine. • Les traitements sont enregistrés sur fichier Excel nommé “Traitements de vaches”. Il énumérera aussi la liste des antibiotiques utilisés et le délai d’attente. (Ordinateur dans l’étable).
Traitement des vaches tarées	
<i>Identifiez, enregistrez et faites un traitement de vaches tarées pour toutes les vaches.</i>	• Prendre en note les traitements sur un babillard dans la salle de traite. • Mettre une bande rouge sur la jambe de toutes vaches traitées. (Les vaches tarées sont identifiées et déplacées dans la vieille étable) • Traiter tous les quartiers avec un traitement de tarissement selon le mode d’emploi. Tremper tous les trayons. • Prendre note du traitement sur fichier excel.
Traitements de vaches en lactation	
<i>Faites des cultures, identifiez les animaux, enregistrez les traitements et traitez selon les recommandations sur les étiquettes des ordonnances vétérinaires.</i>	• Prendre un échantillon d’un quartier infecté. Identifier l’échantillon et congeler pour culture antérieure. • Mettre une bande rouge sur une patte de la vache à être traitée et un trait au marqueur sur la hanche (marqueur rouge dans la salle de traite). • Inscrire le traitement sur un babillard dans la salle de traite. Prendre note du type et temps du traitement pour s’assurer que les vaches ne soient pas vendues ou expédiées avant la fin du délai d’attente. • Traiter la vache selon le mode d’emploi. • Prendre note du traitement sur fichier excel.

de permis

PROCÉDURES NORMALES DE FONCTIONNEMENT – GESTION DES MÉDICAMENTS DU BÉTAIL

Objectif : Pour s'assurer que le lait ou la viande qui est mise en marché soit sécuritaire pour la consommation humaine et ne contiennent pas de résidus.

Procédures de traite pour les vaches en lactation

<i>Faites la traite des animaux traités dans un seau, identifiez les vaches à nouveau si nécessaire, retenez le lait 24 heures de plus que la recommandation sur l'étiquette.</i>	• Traire avec un seau. NOTE: Le seau doit être surveillé pour éviter qu'il ne déborde et vidé après utilisation. • Le marqueur est dans la salle de traite. Marquer chaque vache de nouveau après la traite selon le besoin. • Toujours rajouter 24 heures au délai d'attente indiqué sur le mode d'emploi des médicaments. Si les médicaments ont été administrés hors étiquette, respecter le délai d'attente recommandé par le vétérinaire. La liste des antibiotiques et délais d'attentes sont sur la porte du réfrigérateur et sur fichier excel.
---	---

Vaches achetées

<i>Vérifiez le lait avant l'offre pour la vente.</i>	• Identifier la vache comme vache achetée à l'aide d'une bande de patte de couleur. • Traire avec un seau. • Prendre un échantillon représentatif pour test de résidus antibiotiques et envoyer une culture globale au vétérinaire pour culture bactérienne. • Traire avec un seau et séparer la trayeuse jusqu'à ce qu'un échantillon de lait revienne négatif pour présence d'antibiotiques et que les résultats de la culture soient connus. • Enlever la bande de patte lorsque les résultats sont négatifs.
--	--

Veaux et génisses

<i>Identifiez les animaux à être traités, enregistrez les informations concernant les traitements et traitez.</i>	• Les veaux et génisses doivent être marqués au marqueur rouge avant le traitement. • Le traitement de tous veaux ou génisses doit être enregistré dans le calendrier DHI. • Aucun animal ne peut être vendu ou expédié pendant un délai d'attente.
---	---

de permis

PROCÉDURES NORMALES DE FONCTIONNEMENT – IDENTIFICATION DES ANIMAUX

Objectif : Pour s'assurer que pour la gestion, chaque animal puisse être identifié de façon unique.

PNF	Détails
Génisses et veaux	
<i>Identifiez tous les veaux à la naissance avec des étiquettes NLID.</i>	• Appliquer des étiquettes NLID à tous les veaux mâles à la naissance. • Les génisses nouveau-nées qui seront élevées sur la ferme sont identifiées à l'aide d'étiquettes NLID et tabulées sur fichier informatique.
Vaches en lactation	
<i>Toutes les vaches sont identifiées avec des étiquettes NLID, des dossiers d'enregistrement et ou des cartes.</i>	• Tous les animaux sont des bovins de race, et ont des documents d'enregistrements individuels pour prouver leur identité. • Les animaux sont aussi identifiés avec des étiquettes NLID. • Toutes informations sont enregistrées sur informatique.
Vaches taries	
<i>Les vaches taries sont identifiées de façon unique ou séparées du troupeau.</i>	• Avant d'être traitées, les vaches taries sont marquées avec des bandes de pattes. • Les vaches taries sont placées dans la vieille étable ou pâturages séparés.
Identification sur les animaux traités	
<i>Les animaux traités sont marqués avec des bandes de pattes et ou des marques de couleur sur les flancs.</i>	• Les animaux traités sont marqués à l'aide d'une bande rouge et un trait rouge sur le flanc. • Un suivi des traitements est gardé sur le babillard de la salle de traite et sur informatique. Le type et le temps de traitement est enregistré pour s'assurer que les animaux ne soient pas vendus ou expédiés avant la fin du délai d'attente. • Les génisses et veaux traités sont marqués sur le flanc à l'aide d'un trait rouge. Le traitement est enregistré sur informatique.
Les animaux qui quittent la ferme	
<i>Tous les animaux qui quittent la ferme doivent porter une étiquette NLID et les déplacements doivent être enregistrés et cette information maintenue.</i>	• Les animaux qui quittent la ferme sont identifiés par étiquettes NLID. Ceci inclus les veaux mâles et les vaches de réforme. • Enregistrer toutes les ventes sur le calendrier DHI.

de permis

PROCÉDURES NORMALES DE FONCTIONNEMENT – ACTIONS CORRECTIVES

Objectif : Pour s'assurer que le lait et ou la viande contaminée ne soit pas mise sur le marché.

Actions correctives

A. Si vous pensez que vous avez fait la traite d'un animal traité et que le lait s'est retrouvé dans le bassin :

- Laissez une note pour que le transporteur ne prenne pas le lait.
- Entrez en contact avec le transporteur de lait si possible.
- Appelez le vétérinaire pour qu'un échantillon soit testé. Informez le vétérinaire du médicament utilisé ainsi que les circonstances.
- Si positif, jetez le lait.
- Nettoyez le bassin refroidisseur.
- Si négatif, veuillez entrer en contact avec votre représentant de la DFO ou un agent de mise en marché, donnez les informations et obtenez une autorisation pour mettre le lait sur le marché.

B. Gardez un dossier permanent des actions correctives qui ont été prises concernant le fonctionnement des équipements de traite et de réfrigération :

- Inscrivez les actions correctives sur le calendrier DHI.

Contact :**Concessionnaire d'équipements laitiers :**

Fournisseur d'équipement laitier (999) 999-9999

CT :

DairyCheq 1-866-849-3610 ou (519) 746-6150

Transporteur :

Transporteur (999) 999-9999

Services vétérinaires :

Service vétérinaire (999) 999-9999

Représentant sur le terrain :

RST (999) 999-9999

Bureaux de mise en marché :**Ouest**

(905) 821-8970 (heures d'affaires)
(416) 801-2279 (après 17.00 h)

Est

(613) 774-2835-6 (heures d'affaires)
(613) 930-7604 (après 17.00 h)

Est et centre

(613) 961-8551 (heures d'affaires)
(613) 848-1477 (après 17.00 h)

Région nord et nord-ouest

(705) 474-2060 (heures d'affaires)
(705) 845-1564 (après 17.00 h)